

# Choisir le bon corticostéroïde ou antifongique pour la partie du corps à traiter

## CUIR CHEVELU ET SURFACES PILEUSES

- Dermite séborrhéique, psoriasis
- Pr **Dermovate**<sup>MD</sup> (propionate de clobétasol)  
Application pour le cuir chevelu à 0,05 %
- Pr **Taro-Clobetasol** (propionate de clobétasol)  
Solution topique à 0,05 %
- Pr **Lyderm**<sup>MD</sup> (fluocinonide) Gel à 0,05 %
- Pr **Taro-Sone** (dipropionate de bétaméthasone) Lotion à 0,05 %
- Pr **Taro-Mometasone** (furoate de mométasone) Lotion à 0,1 %
- Pr **Betaderm**<sup>MD</sup> (valérate de bétaméthasone) Lotion à 0,1 %

## TRONC ET EXTRÉMITÉS

- Dermite atopique, eczéma de contact allergique, eczéma nummulaire, lichen plan, psoriasis
- Pr **Dermovate**<sup>MD</sup> (propionate de clobétasol)  
Crème et Onguent à 0,05 %
- Pr **Taro-Clobetasol** (propionate de clobétasol)  
Crème et Onguent à 0,05 %
- Pr **Lyderm**<sup>MD</sup> (fluocinonide) Crème et gel à 0,05 %
- Pr **Taro-Amcinonide** (amcinonide) Crème à 0,1 %
- Pr **Taro-Sone** (dipropionate de bétaméthasone) Crème à 0,05 %
- Pr **Taro-Mometasone** (furoate de mométasone)  
Crème et Onguent à 0,1 %
- Pr **Triaderm**<sup>MD</sup> (acétonide de triamcinolone) Crème à 0,1 %
- Pr **HydroVal**<sup>MD</sup> (valérate d'hydrocortisone)  
Crème et Onguent à 0,2 %
- Pr **Betaderm**<sup>MD</sup> (valérate de bétaméthasone)  
Crème et Onguent à 0,1 % et à 0,05 %
- **Hyderm**<sup>MC</sup> (acétate d'hydrocortisone) Crème à 1 % et à 0,5 %
- **Cortoderm**<sup>MD</sup> (hydrocortisone) Onguent à 1 % et à 0,5 %
- Dermite atopique, eczéma de contact allergique, eczéma nummulaire, névrodermite causée, menacée ou compliquée par une infection bactérienne et/ou à candida
- Pr **Viaderm K.C.**<sup>MD</sup> (acétonide de triamcinolone, nystatine, néomycine, gramicidine) Crème et Onguent
- Tinea corporis (dermatomycose), pityriasis versicolor
- **Clotrimaderm**<sup>MD</sup> (clotrimazole) Crème à 1 %
- Pr **Ketoderm**<sup>MD</sup> (kétoconazole) Crème à 2 %
- CANDIDOSE CUTANÉE
- **Clotrimaderm**<sup>MD</sup> (clotrimazole) Crème à 1 %
- **Nyaderm**<sup>MD</sup> (nystatine) Crème à 100 000 unités/g
- Pr **Ketoderm**<sup>MD</sup> (kétoconazole) Crème à 2 %

## ORGANES GÉNITAUX ET AINES

- Psoriasis, dermatite séborrhéique, névrodermite / lichen simplex chronique
- Pr **HydroVal**<sup>MD</sup> (valérate d'hydrocortisone) Crème à 0,2 %
- Pr **Betaderm**<sup>MD</sup> (valérate de bétaméthasone) Crème à 0,1 % et à 0,05 %
- **Hyderm**<sup>MC</sup> (acétate d'hydrocortisone) Crème à 1 % et à 0,5 %
- Eczéma marginé de Hebra (tinea cruris)
- **Clotrimaderm**<sup>MD</sup> (clotrimazole) Crème à 1 %
- Pr **Ketoderm**<sup>MD</sup> (kétoconazole) Crème à 2 %
- Candidose vulvo-vaginale
- Pr **Taro-Terconazole** (terconazole) Crème vaginale à 0,4 %
- **Clotrimaderm**<sup>MD</sup> (clotrimazole) Crème vaginale à 1 % (6 jours) / 2 % (3 jours)
- **Micozole** (miconazole) Crème vaginale à 2 % (7 jours)
- Pr **Nyaderm**<sup>MD</sup> (nystatine) Crème vaginale à 25 000 unités/g

## BOUCHE

- Lésions buccales enflammées, ulcérations de la muqueuse buccale causées par un traumatisme
- Pr **Oracort**<sup>MD</sup> (acétonide de triamcinolone) Pâte dentaire à 0,1 %

## VISAGE, OREILLES ET COU

- Visage: Dermite séborrhéique, eczéma de contact allergique, photodermatose, névrodermite / lichen simplex chronique
- Pr **HydroVal**<sup>MD</sup> (valérate d'hydrocortisone) Crème à 0,2 %
- Pr **Betaderm**<sup>MD</sup> (valérate de bétaméthasone) Crème à 0,05 %
- **Hyderm**<sup>MC</sup> (acétate d'hydrocortisone) Crème à 1 % et à 0,5 %
- Oreilles: dermatite atopique, psoriasis
- Cou: photodermatose, eczéma de contact allergique, névrodermite / lichen simplex chronique
- Pr **HydroVal**<sup>MD</sup> (valérate d'hydrocortisone) Crème à 0,2 %
- Pr **Betaderm**<sup>MD</sup> (valérate de bétaméthasone) Crème à 0,1 % et à 0,05 %
- **Hyderm**<sup>MC</sup> (acétate d'hydrocortisone) Crème à 1 % et à 0,5 %

## AISSELLES

- Dermite séborrhéique
- Pr **HydroVal**<sup>MD</sup> (valérate d'hydrocortisone) Crème à 0,2 %
- Pr **Betaderm**<sup>MD</sup> (valérate de bétaméthasone) Crème à 0,1 % et à 0,05 %
- **Hyderm**<sup>MC</sup> (acétate d'hydrocortisone) Crème à 1 % et à 0,5 %

## BÉBÉ

- Eczéma infantile
- **Hyderm**<sup>MC</sup> (acétate d'hydrocortisone) Crème à 0,5 %
- Candidose cutanée (érythème fessier du nourrisson causé par une infection à levure)
- **Nyaderm**<sup>MD</sup> (nystatine) Crème à 100 000 unités/g

## MAINS

- Eczéma de contact allergique, dermatite atopique, psoriasis, eczéma des mains
- Pr **Dermovate**<sup>MD</sup> (propionate de clobétasol) Crème à 0,05 %
- Pr **Taro-Clobetasol** (propionate de clobétasol) Crème à 0,05 %
- Pr **Lyderm**<sup>MD</sup> (fluocinonide) Crème à 0,05 %
- Pr **Tiamol**<sup>MD</sup> (fluocinonide) Crème émolliente à 0,05 %
- Pr **Taro-Amcinonide** (amcinonide) Crème à 0,1 %
- Pr **Taro-Sone** (dipropionate de bétaméthasone) Crème à 0,05 %
- Candidose intertrigineuse
- **Clotrimaderm**<sup>MD</sup> (clotrimazole) Crème à 1 %
- **Nyaderm**<sup>MD</sup> (nystatine) Crème à 100 000 unités/g
- Onychomycose des ongles
- Pr **Taro-Ciclopirox** (ciclopirox) Solution topique à 8 %

## PIEDS

- Dermite atopique, psoriasis, eczéma de contact allergique
- Pr **Dermovate**<sup>MD</sup> (propionate de clobétasol)  
Crème et Onguent à 0,05 %
- Pr **Taro-Clobetasol** (propionate de clobétasol)  
Crème et Onguent à 0,05 %
- Pr **Lyderm**<sup>MD</sup> (fluocinonide) Crème et Onguent à 0,05 %
- Pr **Tiamol**<sup>MD</sup> (fluocinonide) Crème émolliente à 0,05 %
- Pr **Taro-Amcinonide** (amcinonide) Crème à 0,1 %
- Pr **Taro-Sone** (dipropionate de bétaméthasone) Crème à 0,05 %
- Tinea pedis (pied d'athlète)
- **Clotrimaderm**<sup>MD</sup> (clotrimazole) Crème à 1 %
- Pr **Ketoderm**<sup>MD</sup> (kétoconazole) Crème à 2 %
- Candidose intertrigineuse
- **Clotrimaderm**<sup>MD</sup> (clotrimazole) Crème à 1 %
- **Nyaderm**<sup>MD</sup> (nystatine) Crème à 100 000 unités/g
- Onychomycose de l'ongle d'orteil
- Pr **Taro-Ciclopirox** (ciclopirox) Solution topique à 8 %



- Crème
- Gel
- Onguent
- Émollient
- Lotion/Solution
- Pâte dentaire

Le surlignage indique les produits antifongiques

Toutes les marques sont des marques déposées

# Tableau des puissances des corticostéroïdes<sup>1</sup>

Le surlignage indique la gamme des produits de Taro

Puissance	Classement	Produit	Dénomination commune	Présentation et concentration
Ultra puissant	1	<b>PrDERMOVATE<sup>MD</sup></b>	propionate de clobétasol	Crème à 0,05 % (DIN 02213265), onguent à 0,05 % (DIN 02213273), application pour le cuir chevelu à 0,05 % (DIN 02213281)
		<b>PrTARO-CLOBETASOL</b>	propionate de clobétasol	Crème à 0,05 % (DIN 02245523), onguent à 0,05 % (DIN 022345524), lotion à 0,05 % (DIN 02245522)
		PrDIPROLENE <sup>MD</sup> Glycol	dipropionate de bétaméthasome	Crème, onguent à 0,05 %
		PrOLUX <sup>MD</sup> -E	propionate de clobétasol	Mousse à 0,05 %
		PrCLOBEX <sup>MD</sup>	propionate de clobétasol	Lotion, shampoing, vaporisateur à 0,05 %
		PrULTRAVATE <sup>MD</sup>	propionate d'halobétasol	Onguent à 0,05 %
Puissant	2	PrCYCLOCORT <sup>MD</sup>	amcinonide	Onguent à 0,1 %
		PrDIPROSONE <sup>MD</sup>	dipropionate de bétaméthasone	Onguent à 0,05 %
		PrTOPICORT <sup>MD</sup>	désoximétasone	Crème, onguent à 0,25 %; gel à 0,05 %
		<b>PrLYDERM<sup>MD</sup></b>	fluocinonide	Crème à 0,05 % (DIN 00716863), onguent à 0,05 % (DIN 02236996), gel à 0,05 % (DIN 02236997)
		PrLIDEX <sup>MD</sup>	fluocinonide	Crème, onguent, gel à 0,05 %
		<b>PrTIAMOL<sup>MD</sup></b>	fluocinonide	Crème émolliente à 0,05 % (DIN 00598933)
		PrLIDEMOL <sup>MD</sup>	fluocinonide	Crème émolliente à 0,05 %
		PrULTRAVATE <sup>MD</sup>	propionate d'halobétasol	Crème à 0,05 %
3		<b>PrTARO-AMCINONIDE</b>	amcinonide	Crème à 0,1 % (DIN 02246714)
		PrCYCLOCORT <sup>MD</sup>	amcinonide	Crème, lotion à 0,1 %
		<b>PrTARO-SONE</b>	dipropionate de bétaméthasone	Crème à 0,05 % (DIN 01925350)
		PrDIPROSONE <sup>MD</sup>	dipropionate de bétaméthasone	Crème, lotion à 0,05 %
		<b>PrBETADERM<sup>®</sup></b>	valérate de bétaméthasone	Onguent à 0,05 % (DIN 007716642), onguent à 0,1 % (DIN 00716650)
		PrCELESTODERM V <sup>MD</sup>	valérate de bétaméthasone	Onguent à 0,1 %
		<b>PrTARO-MOMETASONE</b>	furoate de mométasone	Onguent à 0,1 % (DIN 02264749)
		PrELOCOM <sup>MD</sup>	furoate de mométasone	Onguent à 0,1 %
Modéré	4	SPECTRO ECZEMACARE CRÈME MÉDICAMENTEUSE <sup>MD</sup>	butyrate de clobétasone	Crème à 0,05 %
		PrTOPICORT <sup>MD</sup>	désoximétasone	Crème à 0,05 %
		PrNERISONE <sup>MD</sup>	valérate de diflucotolone	Crème huileuse à 0,1 %
		PrSYNALAR <sup>MD</sup>	acétonide de fluocinolone	Onguent à 0,025 %
		<b>PrHYDROVAL<sup>MD</sup></b>	valérate d'hydrocortisone	Onguent à 0,2 % (DIN 02242985)
		<b>PrTARO-MOMETASONE</b>	furoate de mométasone	Crème à 0,1 % (DIN 02367157), lotion à 0,1 % (DIN 02266385)
		PrELOCOM <sup>MD</sup>	furoate de mométasone	Crème à 0,1 %
		<b>PrTRIADERM<sup>MD</sup></b>	triamcinolone	Crème à 0,1 % (DIN 000716960)
		PrARISTOCORT R <sup>MD</sup>	triamcinolone	Crème, onguent à 0,1 %
5		<b>PrBETADERM<sup>MD</sup></b>	valérate de bétaméthasone	Crème à 0,05 % (DIN 00716618); crème à 0,1 % (DIN 00716626), lotion pour le cuir chevelu à 0,1 % (DIN 00716634)
		PrCELESTODERM V et V/2 <sup>MD</sup>	valérate de bétaméthasone	Crème à 0,1 %; crème à 0,05 %
		PrPREVEX B <sup>MD</sup>	valérate de bétaméthasone	Crème à 0,1 %
		PrVALISONE <sup>MD</sup>	valérate de bétaméthasone	Lotion pour le cuir chevelu à 0,1 %
		<b>PrHYDROVAL<sup>MD</sup></b>	valérate d'hydrocortisone	Crème à 0,2 % (DIN 02242984)
		PrDERMATOP <sup>MD</sup>	prednicarbate	Crème, onguent à 0,1 %
Léger	6	Prpdp-DESONIDE	désonide	Crème, onguent à 0,05 %
		PrVERDESO <sup>MD</sup>	désonide	Mousse à 0,5 %
7		PrEMO-CORT <sup>MD</sup>	hydrocortisone	Crème, lotion à 1 % et à 2,5 % (et génériques)
		PrTOPIDERM HC	acétate d'hydrocortisone	Crème à 2 %
		PREVEX HC <sup>MD</sup>	hydrocortisone	Crème à 1 %
		<b>CORTODERM<sup>MD</sup></b>	hydrocortisone	Onguent à 0,5 % (NPN 00716685) et onguent à 1 % (NPN 00716693)
		<b>HYDERM<sup>MC</sup></b>	acétate d'hydrocortisone	Crème à 0,5 % (NPN 00716820) et crème à 1 % (NPN 00716839)
		CORTATE <sup>MD</sup>	hydrocortisone	Crème à 0,5 %

Références:

1. Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) 2015
2. Toutes les médicaments d'origine sont des marques déposées

# Choisir le bon véhicule



Catégorie de véhicule	Recommandé pour:	Raison
Onguent	<p>Surfaces cutanées sèches, craquelées, fissurées, épaissies<sup>1,2</sup></p> <p>Patients atopiques, patients prédisposés aux allergies (p. ex. dermatite atopique, rhinite allergique, asthme)</p> <p>Surfaces étendues</p>	<p>Le plus occlusif→meilleure pénétration / absorption,<sup>1,2</sup> très efficace pour retenir l'eau dans la peau</p> <p>Les onguents contiennent moins d'eau que les autres véhicules et ils ont par conséquent besoin de moins d'agents de conservation; idéal pour les personnes qui ont des réactions aux agents de conservation</p> <p>Aptitude à un étalement égal<sup>3</sup></p>
Émollient	<p>Lésions sèches, particulièrement si l'acceptabilité par le patient est importante (p. ex., mains)</p>	<p>Ajout du caractère occlusif d'un émollient mais sans la nature grasseuse d'un onguent</p>
Crème	<p>Lésions humides ou suintantes (exsudatives)<sup>1,4</sup></p> <p>Toutes les parties du corps<sup>1</sup></p>	<p>Facile à étendre sur la peau lésée ou suintante, moins occlusive qu'un onguent</p> <p>Effet desséchant<sup>1</sup></p> <p>Évanescence→améliore l'acceptabilité pour le patient / son observance thérapeutique<sup>1</sup></p>
Gel	<p>Surfaces cutanées pileuses<sup>4</sup></p> <p>Inflammation exsudative aiguë (p. ex., herbe à puce)</p>	<p>Thixotrope, les gels se liquéfient à l'application</p> <p>Non-occlusif</p> <p>Desséchant</p> <p>Rafraîchissant</p>
Lotion / solution	<p>Surfaces pileuses</p> <p>Surfaces étendues avec douleur à la pression<sup>2</sup></p>	<p>Facilité d'application</p> <p>Évanescences</p> <p>Rafraîchissantes</p> <p>Desséchantes</p> <p>Peu ou pas de résidus</p> <p>Les moins occlusives</p>

## Références:

1. Drake LA, Dinehart SM, Farmer ER, Goltz RW, Graham GF, Hordinsky MK, et al. Guidelines of care for the use of topical glucocorticosteroids. American Academy of Dermatology. J Am Acad Dermatol 1996 Oct;35(4):615-9.
2. Chaffman, MO. Topical corticosteroids: A review of properties and principles in therapeutic use. Nurse Pract Forum 1999 June;10(2):95-105.
3. Ivens UI, Steinkjer B, Serup J, Tetens V. Ointment is evenly spread on the skin, in contrast to creams and solutions. Br J Dermatol 2001 Aug;145(2):264-7
4. Shear NH, Lui H, Bissonnette R, Vender R. Old friends, new allies: Has the role of topical corticosteroids changed in the era of topical immunomodulators? Dermatology Times of Canada 2004 Jan;13(1):18-21.


# Quantité nécessaire

Quantité minimale de crème (g) nécessaire pour une application deux fois par jour pendant une semaine<sup>1\*</sup>

Âge	Corps entier	Tronc	Bras et jambes
Adulte (homme de 70 kg)	170	60	90
12 ans	120	45	65
8 ans	90	35	50
4 ans	60	20	35
6 mois	35	15	20

Adulte (homme de 70 kg)	<b>Tête et cou</b> 10 g
	<b>Un bras</b> 15 g
	<b>Tronc</b> 60g
	<b>Une jambe</b> 30 g
	<b>Mains et pieds</b> 10 g



\*D'après Hunter et al.

**Conseil de Taro:** Si un patient adulte doit traiter son tronc (devant et dos) deux fois par jour pendant un mois, il aura besoin de plus de 200 g de crème. Un tube de 50 g de crème n'est pas suffisant pour une semaine de traitement.

## Quantité à appliquer

Pour les adultes, il est possible de déterminer la quantité de crème à appliquer sur une surface corporelle à l'aide de la méthode de l'unité du bout du doigt<sup>2\*</sup>



Surface corporelle	UBD pour une application
Visage et cou	2,5 UBD
Tronc (devant ou dos)	7 UBD
Un bras	3 UBD
Une main (devant et dos)	1 UBD
Une jambe	6 UBD
Un pied	2 UBD

**Unité du bout du doigt (UBD)** = quantité de crème ou d'onguent qu'il est possible d'exprimer entre le pli interphalangien distal et le bout de l'index (environ 0,5 g ou 2,5 cm)

\*D'après Long CC, Finary AY.

**Conseil de Taro:** Pour les enfants, les UBD sont mesurées avec l'index d'un adulte. Estimez la taille de la zone atteinte chez l'enfant à l'aide de votre main, chaque zone de la taille d'une main équivalent à 0,5 UBD par application.

Références:

- Hunter JAA, Savin JA, Dahl MV, In : Clinical dermatology. 3rd ed. Blackwell Science ; 2002, Chapter 23 Medical Treatment. p. 319 à 320.
- Long CC, Finary AY. The finger-tip unit-a new practical measure. Clin Exp Dermatol. 1991;16(6):444-447.



Taro Pharmaceuticals Inc.  
130 East Drive, Brampton, ON, L6T 1C1  
Tel: 1-800-268-1975

www.taro.ca

