

TARO-Fingolimod

AVERTISSEMENT : POUR LES COUPLES EN ÂGE DE PROCRÉER

TARO-FINGOLIMOD ET TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION CHEZ LES FEMMES

Des études réalisées sur des animaux suggèrent que le Taro-Fingolimod est susceptible d'avoir des effets nuisibles sur un enfant à naître.

- Si vous êtes une femme en âge de procréer, votre médecin peut alors vous demander de réaliser un test de grossesse avant de commencer votre traitement au Taro-Fingolimod afin de vérifier de manière formelle que vous n'êtes pas enceinte.
- Une contraception efficace **DOIT** être utilisée durant le traitement et pendant deux mois après l'arrêt du traitement, car jusqu'à deux mois sont nécessaires pour éliminer complètement le médicament de l'organisme.
- Discutez avec votre médecin ou professionnel de santé d'une contraception efficace afin de prévenir toute grossesse pendant toute la durée du traitement.
- Voici quelques sites Web pouvant vous informer sur les moyens de contraception disponibles :
 - La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (contient un livret téléchargeable détaillé sur les méthodes de contraception)
 - Réseau de la Santé Sexuelle du Québec

TARO-Fingolimod

AVERTISSEMENT : POUR LES COUPLES EN ÂGE DE PROCRÉER

TARO-FINGOLIMOD ET TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION CHEZ LES FEMMES

- En cas de grossesse, parlez-en à votre médecin immédiatement.
- Si vous tombez enceinte en prenant Taro-Fingolimod, vous pouvez appeler le registre de grossesse Taro-Fingolimod au 1.866.877.5180.
- Le Taro-Fingolimod est sécrété dans le lait maternel. Il n'est pas recommandé d'allaiter un nourrisson tout en prenant ce médicament.

Taro-Fingolimod et reproduction masculine

Les données dont nous disposons ne suggèrent pas que le Taro-Fingolimod puisse être toxique pour un enfant à naître lorsque c'est le père qui le prend.

- Néanmoins, par mesure de précaution, certains cliniciens conseilleraient aux hommes d'arrêter de prendre du Taro-Fingolimod au moins trois mois avant d'envisager de faire un enfant.

